

Anémone

Cerianthus lloydi

Distribution: Méditerranée, Atlantique jusqu'à la Manche, Iles Anglo-normandes jusqu'en Cornouailles.

Habitat: Fixée sur des substrats rocheux ou sablonneux, dans des endroits avec une faible à moyenne amplitude de courant lui permettant ainsi de capturer ses proies. L'anémone de mer est un animal pluricellulaire ou Métazoaire à organisation simple (Eumétazoaire) dont les différentes fonctions sont remplies par des tissus et des organes formés de cellules spécialisées, cellules urticantes (cnidoblastes) qui servent à capturer les proies dont se nourrit l'animal. .

La colonne compte environ 60 tentacules atteignant jusqu'à 8 cm de long. La bouche située au centre des tentacules labiaux sert également d'anus.

Alimentation: En règle générale le Cérianthe se nourrit essentiellement de petits animaux et de plancton bien qu'il soit capable d'ingurgiter des proies plus importantes tels que des petits poissons.



Embranchement:	Cnidaria	Classe :	Anthozoa	S/classe:	Zoantharia
Ordre:	Ceriantharia	S/ordre:		Famille:	Cérianthidae
Genre:	Cerianthus	Espèce:	lloydi	Descripteur:	Gosse, 1859.